

UM NÓVO *Phaneropteridae* DO GÊNERO
Hyperophara BRUNNER

S. DE TOLEDO PIZA JR. e FREDERICO M. WIENDL

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
Universidade de S. Paulo — Piracicaba

***Hyperophara pompeiensis* sp. n.**

Macho: colorido geral verde, com duas estrias vermelho-alaranjadas na cabeça e protórax.

Cabeça verde, com uma listra castanho-avermelhada atrás de cada olho. Palpos maxilares e labiais verdes, com os artículos na parte distal terminando em castanho. Antenas esbranquiçadas, com o artículo basal esverdeado e o segundo castanho claro. Pronoto verde, paralelo, salpicado com pequeníssimas manchas castanho-avermelhadas, com duas listras laterais vermelho-alaranjadas esmaecendo para o amarelo nas margens internas, em continuação às da cabeça. Lobos laterais anteriormente angulosos, arredondados na margem posterior, subretos na inferior, de largura aproximadamente igual ao comprimento. Élitros verdes, área estridulatória marginada de castanho que se continua no limite da área costal, diluindo-se. Veia mediastina ausente. Asas hialinas, aproximadamente um quarto mais longas que os élitros; nervuras, margem anterior e ápice esverdeados. Abdomen verde. Lâmina sub-genital bicarinada, atingindo a dois terços dos cercos, com ápice bidentado de pontas arredondadas (fig. 1). Cercos cilindro-cônicos com dois dentes internos sendo um, a dois terços da base, gros-

so, obtuso e outro no ápice, ligeiramente recurvado (fig. 2) e anteriormente excavado como na fig. 3.

Comprimento do corpo	16,0 mm
Comprimento do pronoto	4,0 mm
Largura do pronoto	3,0 mm
Comprimento dos élitros	24,0 mm
Largura dos élitros	4,5 mm
Comprimento do fêmur posterior	21,0 mm

Tipo: 1 macho, na coleção do primeiro autor.

Coltado em 5-9-67, por S. Otutumi em Pompéia, Estado de São Paulo.

A presente espécie difere de *H. minor* Brunner pela forma dos cercos, cujo dente apical é dirigido para dentro.




Fig. 1 — Lâmina subgenital

Fig. 2 — Cerco

Fig. 3 — Ápice do cerco, corte transversal