

REVISTA DE AGRICULTURA

Diretor responsável: Prof. Salvador de Toledo Piza JunIOR

DIRETORES:

Prof. Octavio Domingues

Prof. Philippe Westin C. de

Prof. F. Pimentel Gomes

Vasconcellos

Secretário: Dr. Luiz Gonzaga E. Lordello

VOL. XLIV

SETEMBRO - 1969

Ns. 2-3

DOIS INSETOS NOVOS DO BRASIL

S. DE TOLEDO PIZA JR.

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"

Universidade de S. Paulo — Piracicaba

Examinando um pequeno lote de insetos da ordem Ortóptera, trazidos do Estado do Rio Grande do Sul pelo entomólogo D. Link, encontrei duas espécies consideradas novas para a ciência, das quais dou abaixo a descrição.

COPIPHORIDAE

Neoconocephalus gaucho sp. n.

Mediocris, viridi-tomentosus. Fastigium verticis multo longius quam latius cylindroconicum, obtusum, apice virescenti, subtus haud infuscatum, dente triangulari paulo prominenti a fastigio frontis valde remotum. Pronotum densissime subtiliter puncturatum, utrinque leviter rufo-signatum, margine postico linea brevi castaneo-nigra a segmentis albis interrupta ornata. Elytra femora postica valde superantia, apice rotundatim truncata, punctis obscuris sparsim ornata. Pedes rufo-punctati. Femora anteriora spinis 2, intermedia 3, albis, apice nigris, intus armata, posteriora spinis similibus numerosioribus extremitatem abominis vix superantia. Lamina subgenitalis fortiter

emarginata, stylis cylindricis praedita. Cerci cylindrici, fortissimi, apice bidentati, dentibus fortiter mucronatis.

Longitudo corporis	32 mm
Longitudo pronoti	8
Longitudo elytrorum ..	36
Latidudo elytr. in medio	5
Longitudo femorum posticorum .	16

Pátria: Santa Maria, Rio Grande do Sul.

Col : D. Link, 12-II-68.

Tipo: 1 macho, na col. do autor.

Aproxima-se de *N. subulatus*, do qual difere pela forma do fastigio do vértice.

CONOCEPHALIDAE

Conocephalus aculeatus sp. n.

Pallide-virescens, disco pronoti vittis rufis duabus longitudinalibus in medio ornato. Antennae rufescentes. Fastigium verticis, ab antico visum, marginibus lateralibus divergentibus, nonnunquam rufescenti. Lobi laterales pronoti margine postico modice rotundato. Elytra alis distincte breviora, extremitatem femorum posticorum valde superantia. Femora postica inferne spinulis nonnullis armata. Tibiae anticae spinis 6. Cerci maris obtusi, prope basin superne dente, inferne spina valida, praediti. Lamina subgenitalis maris late rotundatim incisa, stylis subconicis, acicula instructis. Ovipositor rectus.

	♂	♀
Longitudo corporis	13 mm	13 mm
Longitudo pronoti.	3	3
Longitudo elytrorum ..	15	20
Longitudo femorum posticorum ..	10	10,5
Longitudo ovipositoris .		9,5

Pátria: Santa Maria, Rio Grande do Sul.

Col.: D. Link, 12-II-68.

Tipos: 1 macho e uma fêmea, na coleção do autor.

Parátipo: uma fêmea, da mesma procedência.