

A "PONTA BRANCA" DO ARROZ ATINGE SÃO PAULO

LUIZ GONZAGA E. LORDELLO
Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
Universidade de São Paulo — Piracicaba

MONTEIRO (1963) relatou a ocorrência, em S. Paulo, do nematóide *Aphelenchooides besseyi* Christie, 1942 atacando folhas de morangueiro. Em 1969, LORDELLO encontrou o mesmo nematóide em plantas e sementes de arroz procedentes do Rio Grande do Sul. As plantas exibiam sintomas da doença conhecida internacionalmente como "ponta branca" ("white tip").

Examinando agora sementes de arroz colhidas em Mococa, no Estado de S. Paulo, constatamos a presença do nematóide, porém em fraca infestação.

Fica, assim, assinalada a possibilidade de ocorrer a doença em mais um estado, da região sudeste do País.

SUMMARY

The white tip disease of rice, caused by *Aphelenchooides besseyi*, was first discovered in Brazil in 1969 in the State of Rio Grande do Sul. Seeds sent for examination from Mococa, in the State of S. Paulo, harboured nematodes belonging to same species, the area of occurrence of the disease in the country being greatly enlarged.

LITERATURA CITADA

- LORDELLO, L. G. E., 1969 — Ocorrência do nematóide *Aphelenchooides besseyi* em arroz no Brasil. *Rev. Agricultura* 44: 129-131.
- MONTEIRO, A. R., 1963 — Nematóides em folhas de morangueiro. *Rev. Agricultura* 38: 196.