

REVISTA DE AGRICULTURA

Diretor responsável: Prof. Salvador de Toledo Piza Junior

DIRETORES:

Prof. Octavio Domingues

Prof. Philippe Westin C. de

Prof. F. Pimentel Gomes

Vasconcellos

Secretário: Dr. Luiz Gonzaga E. Lordello

VOL. XLVI

DEZEMBRO - 1971

N. 4

GALLOA GALLOI:

GÊNERO NOVO E ESPECIE NOVA DE *Phaneropteraeidae* DO BRASIL [Orthoptera]

S. DE TOLEDO PIZA JR.

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
Universidade de S. Paulo — Piracicaba

Galloa nov. gen.

Frons convexa, vertex convexiusculus, fastigium verticis gracile, versus apicem modice angustatum atque declive, superne sulcatum, a fastigio frontis lineola divisum. Pronotum antice subteres, postice deplanatum, margine antico disci modicissime emarginato, postico rotundato, in medio lineola vix impressa, lobis deflexis rotundatim insertis, postice quam antice valde altiore, margine inferiore obliquo, posteriore regulariter curvo, anteriore subrecto. Elytra modica, sublaeolata, venis radialibus a basi disjunctis, ramo postico prope extremitatem ramos duos, haud remotos subparallelos, versus marginem posteriorem elytrorum emitente, vena ulnari modice sinuosa, prope ramum venae radialis posticae primum marginem posteriorem elytrorum attingente, campo tympanali in elytro sinistro maris venis tumescientibus, in elytro dextro speculo magno instructo. Alae extremitatem elytrorum valde superantes, apice partis anticae acuto. Sternula lobis brevibus, mesosterno triangularibus, metasterno obtusis. Pedes graciles. Femora omnia subtus sulcata, omnino inermia, III dimidio basali paulo incrassata. Tibiae anticae et intermediae superne sulcatae, spinis nonnulls ad marginem posticum armatae. Segmentum anale maris processu cylindroide, apice subclavato in me-

dio instructa. Lamina subgenitalis maris bidentata, stylis destituta. Cerci teretes, basi crassiores, longe post medium dente valido, ad apicem processu auriformi angusto intus armati.

A genere africano **Corymeta** Brunner, cui affinis est differt pro noto linea longitudinali subelevata in medio destituto, alis elytra valde superantibus, parte antica apice acuto; femoribus omnibus subtus inermibus; cercis haud semicirculariter incurvis, intus dente, a apice foliolo conchato angusto armatis; lamina subgenitali maris convexa.

Galloa galloii sp. n.

Characteribus generis. Gracilis, pedes longes. Caput, pronotum, femora ommia, tibiae anticae lutea; tibiae intermediae et posticae partim virescentes; tarsi-anteriores precipue-virides; spinae omnino vel apice tatum, nigrae; elytra quarta parte basali lutea, parte reliqua viridia, venis densioribus; alae translucidae, venis longitudinalibus castaneo-dilutis, transversalibus viridibus.

Longitudo corporis	18mm
Longitudo pronoti	4
Latitudo pronoti	3
Longitudo elytrorum	28
Latitudo elytrorum ad basim	5,5
Longitudo alarum	33
Longitudo fem. post.	21
Longitudo tibiarum post.	23

Pátria: R. Preto (São Paulo, Brasil).

Col.: Estudante J. Neves, fevereiro de 1971.

Tipo: Um macho, na coleção do autor.

O nome do gênero bem como o da espécie é dado em homenagem ao Prof. DOMINGOS GALLO, Chefe do Departamento de Entomologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" da Universidade de S. Paulo, que me pôs à disposição o material do seu Departamento e as coleções organizadas pelos alunos da sua Cdeira.