

# A PRIMEIRA ARANHA THERAPHOSIDAE DESCrita DA TRANSAMAZÔNICA

S. DE TOLEDO PIZA JR.

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"

Universidade de S. Paulo — Piracicaba

## ***Acanthoscurria transamazonica* sp. n.**

Longitudo Corporis .. . . . .	60mm
Longitudo Cephalothoracis .. . . . .	29
Latitudo Cephalothoracis .. . . . .	26
Longitudo pedum: . . . . . I	92
	II 90
	III 84
	IV 94
Longitudo patellae et tibiae: . . . . . I	33
	IV 33
Longitudo metatarsi postici . . . . .	29

Magnus, robustus, superne uniformiter ater, inferne aterrimus, ab domine pedibusque hirsutis, pilis fulvis longissimis, pedum palporumque segmentis omnibus fimbria alba evidentissima ad extremitatem distalem ornatis, margine antico cephalothoracis similiter fimbriato, patellis vittis 2 longitudinalibus obscuris, leniter expressis, tibiis indistincte vittatis.

Cephalothorax fortissimus, humilis, antice vix elevatus, valde longior quam latior, quam patellae et tibiae I vel IV simul sumptae brevior, striis latis, fovea profunda amplissima, subcirculari, a striis posticis penetrata. Tumulus oculiferus non multo elevatus, latior quam longior, convexus, oculis lateralibus anticis posticisque subcontiguis. Sternum multo longius quam latius, planum. Labium subquadratum, antice crebre cuspidatum. Pedes longes, postici quam antici paulo longiores. Femora III femoribus reliquis haud crassiora.

Apophysis apicalis interna tibiarum anticarum conica, versus extremitatem vix incurva, apice modice incrassato, dentibus nigro-nitidis squamiformibus complurimis cumulatim insertis, rastellum haud designantibus armato. Femora palporum sinuosa; tibiae crassiores, protuberantia conica, prominenti extus praeditae. Bulbus globosus, parvus, rufescens, stylo brevi, lato, partim auriformi.

Pátria: Marabá, E. do Pará, sobre a Transamazônica.

Col.: Professores GUIDO RANZANI e MOACYR CAMPONEZ DO BRASIL SOBR. na Transamazônica, em janeiro de 1972.

Tipo: Um macho, no Departamento de Zoologia da "Luiz de Queiroz".

A presente espécie aproxima-se de *Acanthoscurria paulensis* Mell.-Leit. da qual se distingue pelo tamanho, pelo céfalo-tórax bem mais longo do que largo, de fovea orbicular muito ampla, bem mais curto que a patela mais a tibia I ou IV, olhos laterais anteriores e posteriores quase contíguos, pela apófise apical das tíbias anteriores espessada na extremidade e com os dentes aí acumulados como escamas uns contra os outros, não formando rastelo, e pela saliência externa da tibia dos palpos mais proeminente e aguda.

E' esta a maior Theraphosidae até agora encontrada no Brasil e muito provavelmente a primeira descrita da Transamazônica.

