

REVISTA DE AGRICULTURA

Diretor responsável: Prof. Salvador de Toledo Piza Junior

DIRETORES:

Prof. Octavio Domingues

Prof. Philippe Westin C. de

Prof. F. Pimentel Gomes

Vasconcellos

Secretário: Dr. Luiz Gonzaga E. Lordello

VOL. XLVII

DEZEMBRO - 1972

N. 3-4

UMA ANAULACOMERA SINGULAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

[ORTHOPTERA - PHANEROPTERIDAE]

S. DE TOLEDO PIZA JR.

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
Universidade de S. Paulo — Piracicaba

Anaulacomera surdastra sp. n.

Virescens, leniter rufo conspersus, fronte a latere compressa, oculis rotundatis, antennis albo-nodulosis, vertice vix convexo fastigio profunde sulcato, apice obtuso, a fastigio frontis valde remoto. Pronotum disco subrotundato, margine antico pene recto, postico arcuato, maculis eburneis minimis utrinque longitudinaliter ornato, lobis deflexis rotundatim insertis, longioribus quam altioribus, antice subrectis, inferne sinuosus, postice rotundatis. Elytra subpellucida minute irregulariter reticulata, margine antico recto, postico modice incurvo et obscure punctato, apice rotundato, venis principalibus rectis, ramo radiali paulo ante medium oriente, valde post medium ramos duos parallelos versus apicem elytri emittente, vena ulnari perlonga marginem posticum elytri prope apicem attingente. Campi tympanales castaneo-badii, venis expressis. Alae elytra non multo superantes, apice angulato rotundata. Pedes graciles pilosi. Femora compressa, I superne rotundata, inferne sulcata, inermia; II superne et inferne rotundata, inermia; III parte attenuata spinulis nonnullis armata. Tibiae anticae basi haud dilatatae, sed utrinque sultatae, superne rotundatae, inermes, foramine antico paulo expresso, postico indistincto, tibiae intermediae inermes, posticae spinulosae.

Meso metasternumque lobis rotundatis. Lamina subgenitalis basi ampla, cymbiformi, parte distali parallela, carinata, apice angulato-rotundata inciso. Cerci basi conica valde crassa dense granulata, parte distali, angustata, arcuata, excavata, acute mucronata, cum ramo interno crassiore chelam designante.

Longitudo corporis	15,0 mm
Longitudo pronoti	4,5
Longitudo elytrorum	37,0
Latitudo elytrorum	5,5
Longitudo fem. post.	18,5

Pátria: Viçosa, M.G., Brasil

Col.: Vanetti

Tipo: um macho, no laboratório do autor.

A presente espécie aproxima-se bastante de *Anaulacomera angustifolia* (Sauss.), da qual difere pelos élitros muito mais estreitos, de veias não onduladas, pelo pronoto com três pequenas marcas alongadas da côntra-marfim alinhadas nas margens laterais do disco, pelos fêmures intermedios inermes e pela presença nestes e nos posteriores de pontos rubros esmaecidos. Os buracos auditivos muito pouco manifestos do lado de fora e indistintos do lado de dentro, se não se tratar de uma anomalia individual, parece ser um caracter assas marcante da espécie.

