

# REVISTA DE AGRICULTURA

Diretor responsável: Prof. Salvador de Toledo Piza Junior

## DIRETORES:

Prof. Octavio Domingues

Prof. Philippe Westin C. de

Prof. F. Pimentel Gomes

Vasconcellos

Secretário: Dr. Lulz Gonzaga E. Lordello

---

VOL. XLVIII

OUTUBRO - 1973

Nº. 2-3

---

## UMA NOVA PSEUDOPHYLLINAE DO BRASIL (*Orthoptera-Tettigoniidae*)

S. DE TOLEDO PIZA JR.

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"

Universidade de S. Paulo — Piracicaba

### **Leptottetix uypiranga sp.n.**

♂ — Castaneo-badius uniformis. Caput mediocre, fronte subconvexa, lutescenti, vertice genisque partim opalescentibus, oculis normalibus, rotundatis, antennis remotis, vix nodulosis, castaneis, articulo basilari inermi, fastigio verticis fusiformi, sulcato, a fastigio frontis remoto. Pronotum fortiter ruguloso-puncturatum, partim granulosum, transversaliter bisulcatum, disco antice modice rotundato, postice fortiter, lobis lateralibus perpendicularibus rotundatum insertis, longioribus quam latioribus, margine infero recto. Prosternum, mesosternum metasternumque bispinosa. Elytra paralella, verticalia, coreaceo-membranosa, nitida, apice rotundata, extremitatem abdominis duplo superantia, venis expressis, longitudinalibus a ramis transversis paralellis connectis, campo tympanali triangulari, a venis crassis, luteis, extus castaneo-nigirs limitato, speculo elytri sinistri duplo longiore quam latiore. Coxae anticae spina armatae. Femora anteriores superne rotundata, in-

ferne sulcata spinis 4 intus praedita; femora intermedia anteriores similia sed lobo geniculare interno spinoso; femora postica basi incrassata, extremitatem versus valde attenuata, inferne spinis 5-6 extus tantum armata, apice ab extremitate elytrorum valde remoto. Tibiae I superne deplanatae, inermes, inferne utrinque spinosae; II superne et inferne spinosae; III spinis compluribus superne et inferne armatae. Pedes omnes nitidi. Lamina supravittalis vix latior quam longior, subtruncata. Cerci crassi, post medium abrupte attenuati et arcuati, apice acuti. Lamina subgenitalis parallela, longior quam latior, carinata, angulatim emarginata, stylis fortibus, teretibus praedita.

♀ — Maris similis sed cercis gracilioribus. Ovipositor rectus in medio vix latior, superne a medio usque ad apicem denticulatus, apice ipso sat acuto.

	♂	♀
Longitudo corporis . . . . .	35,0mm	37,0mm
Longitudo pronoti . . . . .	7,0	7,0
Longitudo elytrorum . . . . .	49,0	52,0
Latitudo elytrorum . . . . .	10,5	11,0
Longitudo femorum I . . . . .	14,0	16,0
Longitudo femorum II . . . . .	14,0	16,0
Longitudo femorum III . . . . .	30,0	32,0
Longitudo ovipositoris . . . . .	—	24,0
Latitudo ovipositoris . . . . .	—	2,8

Pátria: Uypiranga, E. do Amazonas, Brasil.

Col.: Parko, Outubro, 1941.

Tipos: Um macho e uma fêmea no Departamento de Zoologia da ESALQ.

Parátipos: Um macho e uma fêmea, mesma procedência, mesmo colecionador, mesma data, no mesmo Departamento.