

REVISTA DE AGRICULTURA

Diretor responsável: Prof. Salvador de Toledo Piza Junior

DIRETORES:

Prof. Octavio Domingues

Prof. Philippe Westin C. de

Prof. F. Pimentel Gomes

Vasconcellos

Secretário: Dr. Luiz Gonzaga E. Lordello

VOL. XLVI

SETEMBRO - 1971

Ns. 2-3

UM NOVO COPIFORÍDEO (*Orthoptera, Insecta*)

S. DE TOLEDO PIZA JR.

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
Universidade de São Paulo — Piracicaba

Neoconocephalus lavrensis s. n.

♂ — Cinereo-viridis, uniformis. Fastigium verticis longius quam laevis, inferne obscure fasciatum, dente brevi a fastigio frontis distincte secto. Oculi nigri. Os coralimum. Pronotum minutissime punctatum, disco antice posticeque rotundato et postice modice ampliato, lobis deflexis longioribus quam latioribus, rotundatim insertis, inferne angulato-rotundatis. Meso et metanotum in medio obscura. Elytra femora postica valde superantia, parallela, apice rotundato, venis concoloribus, maculis nigris nonnullis obtecta. Femora omnia subtus nigra, antica et intermedia spinis 3 intus, postica compluribus utrinque. Segmentum anale rotundatim emarginatum. Lamina subgenitalis utrinque depressa, fortiter angulato-rotundatim emarginata.

Long. corporis	31	mm
Long. pronoti	9	
Long. elytrorum	41	
Long. fem. posticorum	22	
Long. fastigii	1,6	

Tipo: 1 macho no lab. do autor.

Pátria: Lavras, M. G.

A presente espécie aproxima-se de *Neoconocephalus fusco-striatus* Redtb., do qual se distingue pelo fastigio do vértice mais longo do que largo, pela ausência das listras escuras laterais do disco protoral, e pelas veias radiais da mesma côr do resto dos élitros.