

REVISTA DE AGRICULTURA

Diretor responsável: Prof. Salvador de Toledo Piza Junior

DIRETORES:

Prof. Octavio Domingues

Prof. Philippe Westin C. de

Prof. F. Pimentel Gomes

Vasconcellos

Secretário: Dr. Luiz Gonzaga E. Lordello

VOL. XLVIII

DEZEMBRO - 1973

Nº 4

UMA PHYLLOPTERA DESCONHECIDA (*Phaneropteridae-Orthoptera*)

S. DE TOLEDO PIZA JR.

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"

Universidade de S. Paulo — Piracicaba

Phylloptera incognita sp.n.

Viridis. Frons albescens, convexa lateraliter compressa. Vertex convexus, linea flava longitudinali in medio, lineis simillibus sed fortioribus post oculos ornatus, fastigio sulcato cum fastigio frontis haud contiguo. Pronotum disco plano subparallelo antice paulo recurvo, postice vix latiore et regulariter curvo, lateraliter acute angulato, linea flava ornata, lobis deflexis perpendicularibus, aitioribus quam longioribus, antice subrectis, inferne et postice regulariter rotundatis, disco partim castaneo. Elytra opaca, apice rotundata, venulis pallidis reticulata, vena radiali posteriore flava, ramo radiali circa medium oriente, prope medium diviso, ramis subparallelis marginem posticum elytrorum attingentibus, vena ulnari biramosa, macula ferrugineo-pallida subtriangulari ad punctos implantationis ramorum, altera in connexione cum ramo primo ramo radialis sita. Ovipositor regulariter curvus, marginibus parallelis, castaneis, serrulatis, disco ruguloso.

Longitudo corporis	21,0 mm
Longitudo pronoti	5,5
Longitudo elytrorum	38,0
Latitudo elytrorum in medio	13,5
Longitudo femorum post.	21,0
Longitudo ovipositoris	7,0

Pátria e coleitor desconhecidos. E' provavelmente de Piracicaba, E. de São Paulo, Brasil.

Tipo: Uma fêmea, na coleção do autor.

Aproxima-se de *Phylloptera phyllopterooides* (Brunner), da qual se distingue por apresentar nas tégminas 3 manchas ferrugíneas assaz conspicuas, seguindo a veia ulnar.

