

## NOTA ENTOMOLÓGICA

### CHLOSYNE SAUNDERSII praga do Girassol

Z. C. Maranhão

Laboratório de Entomologia

Em Março do corrente ano, recebi no Laboratório de Entomologia, procedentes da Seção de Genética, algumas fôlhas de girassol quase totalmente recobertas por pequenas lagartas de diversas idades, cuja coloração geral variava desde o marron-escuro até o preto, passando por diversas tonalidades.

Colocadas as fôlhas com as respectivas lagartas em um pequeno viveiro, continuei a alimentá-las diariamente com fôlhas sempre frescas de girassol, até a sua transformação em crisálidas.

Nesse meio tempo, consultando a nossa bibliografia entomológica sôbre as pragas das nossas plantas cultivadas, não me foi possível encontrar qualquer indicação sôbre "Lagartas atacando o girassol", sendo apontadas como pragas mais frequentes ou comuns da folhagem as vaquinhas *Calcophana viridipennis* (Col. — Eumolpidae) e *Diabrotica speciosa*. (Col. — Galerucidae).

O que me restava fazer era esperar pelo nascimento das borboletas para a sua posterior identificação. Nascidas as mesmas, procedi imediatamente a "determinação por comparação" com os exemplares da coleção de borboletas da Cadeira de Zoologia, terminando por constatar ser a espécie em questão *Chlosyne saundersii* (Lep. — Nymphalidae) — mais uma praga do girassol (*Helianthus annuus*) atacando severamente as fôlhas, deixando-as, não raras vezes, reduzidas à sua nervura principal e algumas secundárias.