

REVISTA DE AGRICULTURA

Cx. Postal 60 - 13.400 Piracicaba
Estado de S.Paulo - Brasil

DIRETORES

Prof. Dr. S. de Toledo Piza Jr.

Prof. Dr. F. Pimentel Gomes

Prof. Dr. Ph. W.C. Vasconcellos

SECRETÁRIO

Prof. Dr. Luiz Gonzaga E. Lordello

Vol. 56

Junho de 1981

N.ºs 1-2

VOLUME DO 80.º ANIVERSÁRIO DA
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA «LUIZ DE QUEIROZ»
1901 — 1981

**DUAS NOVAS ESPÉCIES DE PARABLETA
MUITO AFINS**
(*Orthoptera-Tettigoniidae-Phaneropterinae*)

S. de Toledo Piza Jr. (¹)

Parableta riparia sp. n. (Fig. 1)

Viridis, mediocris. Vertex subconvexus, fastigio sulcato, apice rotundato cum fastigio frontis haud contiguo. Frons convexa, utrinque modice compressa, nitida. Oculi vix oblongati. Antennae filiformes, concolores. Pronotum disco plano, longitudinaliter sulcato, margine antico recurvo, postico rotundato, lobis deflexis angulatim insertis, perpendicularibus, vix altioribus quam longioribus, antice rectis, inferne et postice rotundatis. Elytra elongato ovata, apice rotundata, opaca, puncturata, venis radialibus vix sinuosis, ramo radiali ante medium oriente, prope medium diviso, ramis modice flexuosis, subparallelis, marginem posticum elytri prope apicem attingentibus, vena ulnari paene recta, macula parva diluta seu indistincta ad originem ramorum posticorum, venis longitudinalibus a venulis gracillimis connectis, vena plicata fragili. Femora antica et intermedia spinulis minutissimis

(¹) Escola Superior de Agricultura «Luiz de Queiroz», USP, Piracicaba.

3-4, femora postica spinis 7 ad marginem internum. Tibiae anticae spina singula, intermediae spinis tribus. Lamina supraanalisis triangulo-rotundata. Cerci cylindro-conici, arcuati, apice obtuso, minutissime denticulato. Lamina subgenitalis carinata, apice in medio truncata, utrinque modice producto, stylis brevibus.

| | |
|----------------------------|-------|
| Longitudo corporis | 21 mm |
| Longitudo pronoti | 5 mm |
| Longitudo elytrorum | 28 mm |
| Latitudo elytrorum | 11 mm |
| Longitudo fem. ant. | 5 mm |
| Longitudo fem. post. | 18 mm |

Pátria: Barra do Tapirabé, Mato Grosso.

Col.: B. Malkin, I-1966.

Tipos: Dois machos pertencentes ao Museu de Zoologia da USP, presentemente no Departamento de Zoologia da ESALQ, Piracicaba.

Difere de *Parableta phyllopterooides* Brunner por possuir os élitros mais largos, os fêmures anteriores e medianos providos inferiormente de espinhos não sanguíneos e a lamina subgenital truncada no ápice, estilos breves.

Parableta difficilis sp. n. (Fig. 2)

Speciei precedenti simillima differt disco pronoti non-nihil latiore, marginibus elytrorum magis arcuatis, cercis fortiter incurvis, dimidia parte apicali sensim incrassata, apice bidentato.

| | |
|----------------------------|---------|
| Longitudo corporis | 18 mm |
| Longitudo pronoti | 4,2 mm |
| Longitudo elytrorum | 27 mm |
| Latitudo elytrorum | 11 mm |
| Longitudo fem. ant. | 5 mm |
| Longitudo fem. post. | 18,5 mm |

Pátria: Corumbá, Estado de Mato Grosso.

Col.: K. Lenko, XII-1960.

Tipo: Um macho, do Museu de Zoologia da USP, no Departamento de Zoologia da ESALQ, Piracicaba.

Considero precária a presente espécie porque ela se baseia em caracteres distintivos de difícil apreciação.



Cercos: 1 - *Parableta riparia*; 2 - *Parableta difficilis*.