MÉTODO «RIBEIRÃO PRETO» DE ENXERTIA DE SERINGUEIRA (Nota Prévia)

Léo Gomes de Moraes (1) Rita Maria Borges de Moraes (2)

Um novo método de enxertia de seringueira (Hevea brasiliensis Muell.Arg.) foi experimentado. A finalidade era conseguir uma muda padrão, vigorosa, erecta, com índice elevado de pegamento, que pudesse ir mais cedo para o campo, sem os traumatismos que uma muda de trinta meses sofre ao ser arrancada e que atendesse à demanda para atingirmos a autosuficiência no setor de borracha. Segundo o Programa de Incentivo à Produção de Borracha Natural (PROBOR II), aprovado em 8.10.1977, a necessidade brasileira é de 119 milhões de mudas.

O experimento se realizou no Sítio Jardim Santa Martha, em Ribeirão Preto, SP, comparando o método de HUROV (1963) conhecido como «enxertia verde» ou borbulhia, com o método idealizado. Este recebeu o nome de «Ribeirão Preto» e consistiu de uma garfagem aos 6 meses, pela técnica denominada «Inglês Simples».

Para a comparação entre o processo de garfagem e o de borbulhia foi conduzido o experimento, com parcelas inteiramente casualizadas e 5 repetições. Procurando-se melhores condições climáticas, foram utilizadas duas épocas de enxertia: 14.11.1977 e 11.12.1977.

Obteve-se um melhor pegamento dos enxertos por garfos que por borbulhas, especialmente quando as condições foram adversas. As mudas obtidas por garfagem são erectas e de perfeito sistema de condução.

¹⁾ Posto de Sementes, Secretaria da Agricultura, Ribeirão Preto, SP.

Acadêmica da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", USP, Piracicaba.

-METODO -METRAD PRESON OF ANXESTS
- DE SERVINGUESTA
- DE SERVINGUESTA

Liko Games La Morges (1) Suria Bornes de Morges (2)

Um novo márská do aroadio de serinquene (Nevez Lebert Nensio Muell. Arg.) fur reportmenteda. A finalidade era consequir en a cude puorso, agracado, cam indee etavado do por puraento, que procesa à ir mais cedo para o asympo, seur os surprenda castramos que entre mada de funta mestra sotre eo ser amprenda e que s'enderse à demandà para enugingos a autoseficiando no estat tar borracha. Segundo o finograma da incantivo a Propugado de Borracha. Segundo o finograma da incantivo a Propugado de Borracha. Propugado el la nueva a la transportada de considera de de 119 maios. La nueva a matas.

D, experimento as realizon no Sicio Jartim Santa Martha, em Rossido Prato. SP, comparando e metado de MUROV (1963) contracido como senxertira verdes ou porbuilita, esen o metado riderizado. Esta redebeu o nome de «Nickirko Preto» e consistru de uma garragem aos 6 mesec, pela técnica denominada «Inglés».

Para a comparação entre o processo de gartagem e o de borbulbia foi conduzido o experimento, com parcelas inteiramente casualizadas e 5 repetições. Procurendo-se melhores condições climáticas, foram utilizadas duas ápocas de anxenta:

