

REVISTA DE AGRICULTURA

Cx. Postal 60
13.400 Piracicaba
Est. de S.Paulo-Brasil

Diretores:

Prof. Dr. S. de Toledo Piza Jr.
Prof. Dr. F. Pimentel Gomes
Prof. Dr. Ph. W.C. Vasconcellos

Secretário:

Prof. Dr. Luiz Gonzaga E. Lordello

Vol. 58

Junho de 1983

Nº 1-2

MAIS UMA *Vates* (MANTODEA-VATINAE)
DO BRASIL

S. de Toledo Piza Jr.¹

Vates obscura sp. n.

Fusco viridis. Metazona pronoti marginibus dentibus magnis, appropinquatis, circa 12 armata, prozons dentibus sat minoribus, dilatatio brevis, rotundata, dentibus minimis. Elytra subtranslucida, maxima parte modice obscuriore, antice plagis triangularibus sat densioribus ornata, area costali ad venam medias tinam sat obscura, deinde viridi, margine anteriori luteo. Alae translucidae, apice obscuro. Prosternum sub dilatatione ac ad aream spinarum nigrum. Pedes castaneo-nigro marmorati vel punctati. Coxae anticae subtus lutescentae, basi et apice nigrae, marginibus dentibus nigris 5, alteris minoribus luteis extus armatae. Femora antica areis 3 obscuris. Femora 4 postica lobis foliaceis obscuris prope apicem, femora intermedia etiam ad basim, Tibiae 4 posticae lobis magnis in medio, rudimentaribus ad extremitatem.

Longitudo:


corporis	61 mm
pronoti	23
elyptri	42

Pátria: Acre, Cruzeiro do Sul

Col.: Francisco de Assis G. de Melo, IV-1981

Tipo: um macho, no Depto. Zool. da ESALQ.

Aproxima-se de *Vates pectinata* Sauss., da qual se dintingue pelo colorido e desenhos, sobretudo dos élitros, pelos dentes marginais do pronoto, que são grandes e muito aproximados e pelas patas destituídas de anéis escuros.



Vates obscura, ♂