

REVISTA DE AGRICULTURA

Cx. Postal 60
13.400 Piracicaba
Est. de S.Paulo-Brasil

Diretores

Prof. Dr. S. de Toledo Piza Jr.

Prof. Dr. F. Pimentel Gomes

Prof. Dr. Ph. W.C. Vasconcellos

Secretário

Prof. Dr. Luiz Gonzaga E. Lordello

Vol. 57

Dezembro de 1982

Nº 4

UMA NOVA ESPÉCIE DE *Cerberodon* DO BRASIL
(TETTIGONIIDAE, LYSTROCELLINAE)

S. de Toledo Piza Jr.¹

Cerberodon cuiabensis sp. n.

♂ - Colore castaneo-badia. Frons ampla, convexiuscula, levitur puncturato-rugolosa, nitidula. Mandibulae nigerrimae, nitidissimae, sinistra medio in angulo recto inflexa, parte terminali vix sinuosa. Oculi nigro maculati. Scrobiae segmenta basalia antennarum obscuriora. Pedes crassi, concolores, uniformes, antici modicissime sinuosii. Femora antica subtus praeter spinulis, spinis 5 armata, spinis basalibus minoribus, utrinque armata. Femora intermedia femoribus anterioribus similia. Femora postica spinis parvis numerosis. Tibiae 4 anticae subtus spinarum paribus 3, basi spinarum densiore, intermediae supra spinis 3-1. Tibiae posticae spinis compluribus supra et subtus praeditae. Segmenta addominalia ventralia in medio nigro-nitida. Lamina subgenitalis in medio depressa, margine postico ample U-incisa, stylis terelibus extremitatem cercorum valde superantibus. Cerci crassi, subconici, bre-

¹ Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba, USP.

ves, modice incurvi, unco valido, acuto in angulo recto disposito, ad apicem praediti.

♀ - Mari similis sed cercis gracilioribus, unco parvo praeditis, lamina subgenitali magna, ebescenti, triangulari, haud incisa, ovipositori gracili, subrecto, acuto.

Dimensiones:


	♂	♀
Corporis	29 mm	39
pronoti	9	9
fem. ant.	17	16
fem. post.	26	27
tile. ant.	16	16
ovipositoris		23

Pátria: Cuiaba, M.T. (Alta Floresta)

Col.: L.L. Fernandes, 4-1-78

Tipos: 1 ♂ e 1 ♀, no Dep. Zool. ESALQ, Piracicaba.

Difere de *Cerberodon angustifrons* Piza pela fronte mais ampla, pela garra dos cercos do macho e pela lâmina subgenital incisa em U e pelos fêmures mais espessos. De *C. viridis* Perty pela coloração, pela forma dos cercos do macho, pelo bordo posterior da lâmina subgenital não fissurado e pelos estilos mais longos.



Cerco do macho e lâmina subgenital da fêmea