

**REVISTA DE AGRICULTURA**

Cx. Postal 60 - 13.400 Piracicaba  
Estado de S.Paulo - Brasil

Vol. 57

Setembro de 1982

N.ºs 1-2

**DIRETORES**

Prof. Dr. S. de Toledo Piza Jr.

Prof. Dr. F. Pimentel Gomes

Prof. Dr. Ph. W.C. Vasconcellos

**SECRETÁRIO**

Prof. Dr. Luiz Gonzaga E. Lordello

**UMA Gratidia NOVA DO BRASIL**  
(*Phasmidae - Pachymorphinae*)

S. de Toledo Piza Jr.(1)

**Gratidia gracilis** sp.n.

Corpus et pedes sat graciles, omnino badia. Caput sat elongatum, pronoto aequa longum, postice vix angustius, inerme, castaneo-nigro trivittatum, vittis per thorace ac abdomine sequentibus, extremitatem abdominis versus sensim evanescentibus. Antennae apicem femorum anticum haud attingentes. Nota sublaevia, carina rotundata humillima a granulis obsoletissimis signata in medio praedita. Femora intermedia metanoto cum segmento mediano sat longiora. Segmentum abdominale dorsale ultimum carinatum, emarginatum, lobis rotundatis minute dentatis. Lamina subgenitalis corrugata, versus apicem fortiter carimata, apice ipso in squama elevato, basim segmenti anali haud attingente. Cerci teretes, crassi, obtusi, vix sinuosi.

## Longitudo:

corporis	86mm
mesonoti	22mm
metan. c.s.m	16mm
fem. ant.	35...mm
fem. post.	27/mm

Patria: Pereira Barreto (S.P.)

Col.: Vilma Maule, XI - 72

Tipo: Um macho, no Dep. Zool. ESALQ, Piracicaba

Parátipo: Um macho um pouco maior, de Cuiaba, MT,  
col. por O. Sales Jr. em 26 - X - 77.

Difere das espécies afins por apresentar a cabeça desarmada e pelas três listras longitudinais do corpo. De *Gratidia propinqua* Gigl. Tos, de que muito se aproxima, difere pelos fêmures anteriores mais curtos, não alcançando o limite do metanoto com o segmento mediano e pela lâmina subgenital mais longa, ultrapassando muito o meio do segmento anal.