

SOBRE A OCORRÊNCIA DE UM GEOMETRÍDEO EM *Pinus oocarpa* SCHIEDE

Evoneo Berti Filho (1)

Recentemente, constatou-se a ocorrência de *Fulgurodes* sp. (Lepidoptera, Geometridae), espécie muito próxima de *F. inversaria* Guenée, em *Pinus oocarpa* Schiede, no Município de Sacramento, Estado de Minas Gerais. As lagartas, do tipo medepalms, devoram totalmente as acículas, deixando os galhos desnudos. Os ovos são de forma ovalada e de coloração verde clara, colocados isoladamente ou em grupos de dois ou três, nas acículas e nos galhos. As lagartas são de coloração amarelada, com manchas negras circundando a parte posterior de cada segmento; a cabeça é de coloração negra. As pupas são de coloração amarela clara, com estrias marrons e uma pequena área amarela intensa na altura dos olhos; o segmento anal e o cremaster são de cor negra. As pupas são envolvidas por um casulo amarelo claro e com uma estrutura muito semelhante a uma rede de pescar. Os adultos apresentam as asas, o tórax e o abdome de coloração geral branca, com listas e desenhos regulares, de cor marrom, mais abundantes nos bordos das asas; as pernas são marrons escuras. A espirotromba é amarela e as antenas são marrons escuras, filiformes nas fêmeas e bipectinadas nos machos.

SUMMARY

Fulgurodes sp. (Lepidoptera, Geometridae), a species very close to *Fulgurodes inversaria* Guenée, is reported as a defoliator on ocote pine, *Pinus oocarpa* Schiede, in the State of Minas Gerais, Brazil. The egg, larva, pupa, and adult stages are briefly described.

(1) Escola Superior de Agricultura «Luiz de Queiroz», USP, Piracicaba.