

**UMA AGRAECIINAE E UMA PSEUDOPHYLLINAE
NOVAS DO BRASIL
(Orthoptera - Tettigoniidae)**

S. deToledo Piza Jr. (1)

***Agraecia malkini* sp. n. (Agraeciinae)**

Testacea, nitida. Fastigium verticis breve, conicum. Frons subplana. Oculi normales. Antennae uniformes. Pronotum uniforme, disco tenuiter ruguloso, vix sulcato, margine antico nonnihil sinuoso, postico rotundato-truncato. Elytra longa, parallela, apice rotundata, extremitatem abdominis plus quam duplo superantia, dimidium tibiarum posticarum atingentia, maculis obscuris irregularibus complurimis obtecta. Campus tympanalis in elytro sinistro indistinctus. Alae hyalinae. Femora antica subtus spinis 3-4 intus armata, femora intermedia 5 extus, postica 8 extus, 2 intus. Lobi geniculares femorum 4 posticorum utrinque spinosi, femorum anticorum intus tantum. Segmentum abdominalis dorsale ultimum fortiter emarginatum. Cerci validi prope extremitatem inferne processo brevi, dentiformi armati, extremitate ipsa altero longissimo, cylindrico, acuto, fortiter recurvo continuati. Lamina subgenitalis parallela, profunde V-incisa, stylis crassis, cylindricis praedita.

Longitudo:

corporis	23 mm
pronoti	7 mm
elytrorum	35 mm
femorum ant.	8 mm

femorum post	18 mm
tibiarum post	20 mm

Pátria: Igarapé Curupi, Aldeia Araçú, MA.

Col.: Malkin, V-1963, a quem é dedicada a espécie.

Tipo: Um macho, pertencente ao Museu de Zoologia da USP, presentemente na ESALQ, Piracicaba.

Aproxima-se de *A. festae* Griff, da qual se distingue pela ausência de listras na cabeça e no pronoto, fronte sem manchas ou lineolas, pelo fastígio do vértice mais curto, pelo campo timpanal esquerdo indistinto e pelo lobo genicular externo dos fêmures desarmado.

Rhinischia precaria sp. n. (Pseudophyllinae)

♂ - Castaneo-sordidus, partim nigricans. Caput parte anteriore castaneo-nigra, nitida, genis vertice, que dilutis, anten-nis castaneis haud anulatis, breve pilosis, articulo basilari spina apicali acuta armato, fastigio verticis concavo, apice obtuso, marginem scrobi antennarum vix superante. Pronotum modice rotundatum, sublaeve, sulco postico obtusangulo, margine antico fortiter procurvo, metanoto mesonoto longiore, densiore, modice ascendenti, margine curvo. Elytra elongata, apicem versus angustata, irregulariter castaneo-maculata, maculis parce expressis, extremitatem femorum posticorum valde superantia, speculo sinistro semiopaco, multo longiore quam latiore. Abdomen ventraliter nigronitidum. Alae cinereae, venis flavis. Pedes omnes dense pilosi. Protuberantia ventro-caudalis coxarum II dimidiata partem ventralem trochanterum attingens. Femora antica subtus margine interno spinis 3, margine externo haud spinuloso sed leviter undulato. Femora II subtus spinis 4 omnino fere nigris. Femora III face media lis nigro-nitido-vittata, inferne spinis versus apicem crescentibus, curvis, partim nigris, 9 armata, lobis genicularibus foliaceis, apice spiniformi. Tibiae posticae superne spinis 12 intus, 10 extus. Lamina subgenitalis bilobulata, lobis magnis, depressis, sat remotis, stylis falciformibus, acutis, in medio vix ampliatis, lobis longioribus et super los plicatis. Cerci validi, conici apice curvo, mucronato.

Longitudo corporis	32,0 mm
" pronoti	9,0 mm

"	elytrorum	44,0 mm
"	fem. ant.	11,5 mm
"	fem. post.	27,0 mm
"	lam. subgenit.	4,2 mm
"	stylorum	5,2 mm

Pátria: Paraíba, J. Pessoa.

Col. Padre Pereira, VII - 1955.

Tipo: Um macho, no Departamento de Zoologia da Esalq, Piracicaba.

Aproxima-se de *Rhinischia transiens* Beier, da qual se distingue pelo tamanho muito maior, pela ausência das linhas negras do pronoto, pela presença de uma fita negra na face interna dos fêmures posteriores e ausência do anel pré-apical.