

REVISTA DE AGRICULTURA

Cx. Postal 60  
13.400 Piracicaba  
Est. de S.Paulo-Brasil

Diretores:

Prof. Dr. S. de Toledo Piza Jr.

Prof. Dr. F. Pimentel Gomes

Prof. Dr.Ph. W.C. Vasconcellos

Secretário:

Prof. Dr. Luiz Gonzaga E. Lordello

---

VOL. 58

DEZEMBRO/1983

Nº 4

---

UMA THESPINEA NOVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
(MANTODEA-MANTIDAE)

S. de Toledo Piza Jr.<sup>1</sup>

**Musoniella precaria sp.n.**

Colore badia. Pars frontalis supra ocellos alta, a carina verticali divisa, maculis castaneo-nigris duabus necnon punctis castaneis ornata, linea dorsali, recta, diluta, Scutellum frontale angustum, paralellum, nigro granulatum. Occiput dilutum postice lineam dorsalem verticis castaneo nigrum. Pronotum carinatum, utrinque late castaneo-nigro vittatum, prozona granulis nigris non nullis in medio, marginibus dentatis, dilatatione rotunda non multo prominente. Elytra venis transversis ad insertionem obscuris ac valde crassoribus. Area costalis ad venam mediastinam late castaneo-nigro vittata. Coxae anticae antice ad marginem internum granulis spiniferis humillimis nigris praeditae. Sulcus unguicularis femorum anticorum macula nigra praeditus.

---

<sup>1</sup> Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", USP,  
Piracicaba.

Longitudo pronoti      4 mm  
Longitudo elytrorum    15,5

Pátria: Petrolina, Pernambuco, Brasil.

Col.: G.J. Moraes, 31-03-81.

Tipo: um macho corroido por formigas.

A espécie caracteriza-se pelas duas largas listras escuras laterais do pronoto e pela listra escura que acompanha a veia mediastina na área costal dos élitros.