

OCORRÊNCIA DE NEMATÓIDES DO GÊNERO
Meloidogyne GOELDI, 1887 (NEMATODA, HETERODERIDAE)
EM ALGUMAS PLANTAS CULTIVADAS DO
ESTADO DO PARANÁ, BRASIL

Benedito Baptista dos Santos ^{1, 2}
Luiz Antônio Torres da Silva ¹

Dentre os inimigos das plantas cultivadas, os nematóides do gênero *Meloidogyne* Goeldi, 1887 (Nematoda, Heteroderidae) são de grande importância devido ao seu polifagismo, nocividade e difícil controle.

No Brasil, existem várias listas de plantas hospedeiras destes nematóides, sendo muitas delas mencionadas por LORDELLA (1981) e por PONTE (1977) que revisou a literatura brasileira até aquela data. No Paraná, citações têm sido feitas, principalmente, das espécies ocorrentes em cafeiro (LORDELLA & ZAMITH, 1960; VERNALHA et al., 1967/70; LORDELLA et al., 1974), em algumas plantas cultivadas (FONTOURA et al., 1980; IEDE et al., 1983), e ervas daninhas (ANTONIO & LEHMAN, 1978).

¹ Centro de Diagnóstico "Marcos Enrietti", Convênio Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná/FUFPR, Curitiba, PR.

Este trabalho relaciona algumas plantas cultivadas, de diferentes municípios do estado do Paraná, que apresentaram meloidoginose, as quais foram remetidas e analisadas no Laboratório de Fitoparasitologia do Centro de Diagnóstico "Marcos Enrietti".

A identificação específica dos nematóides foi feita através do exame da região perineal das fêmeas, colocada em lâmina contendo lactofenol, conforme LORDELLA (1964).

O material examinado e os resultados obtidos foram os seguintes:

Algodeiro - *Gossypium hirsutum* L.

variedade 'IAC-17'

Meloidogyne incognita Umuarama

Antúrio - *Anthurium* sp.

Meloidogyne incognita Curitiba

Bananeira - *Musa cavendishii* Lambert

variedade 'Nanicão'

Meloidogyne incognita Guaratuba

Batata-inglesa - *Solanum tuberosum* L. -

Meloidogyne incognita Guarapuava e Piraquara

variedade 'Bintje'

Meloidogyne sp. Castro

Batata-salsa - *Arracacia xanthorrhiza* Bancr.

Meloidogyne sp. Agudos do Sul e Tijucas do Sul

Meloidogyne hapla Agudos do Sul e Tijucas do Sul

Meloidogyne incognita Agudos do Sul e Tijucas do Sul

Bracatinga - *Mimosa scabrella* Bentham

Meloidogyne javanica Almirante Tamandaré, Colombo e Ponta Grossa, em

Cafeeiro - *Coffea arabica* L.*Meloidogyne* sp.Ibirapuã, Iporã, Manda-guari e Rondon, em mudas
Boa Esperança e Cianorte, em plantas adultas;
Iporã, Japurá, Rondon e São Tomé, em mudas

variedade 'Mundo Novo'

Meloidogyne incognita

Cianorte, em plantas adultas; Indianópolis, em mudas

variedade 'Sumatra'

Meloidogyne incognita

Cianorte, em plantas adultas

Cenoura - *Daucus carota* L.*Meloidogyne javanica* Campo Mourão e MarialvaChuchuzeiro - *Sechium edule* Swartz

variedade 'Paulista'

Meloidogyne incognita MorretesFeijoeiro - *Phaseolus vulgaris* L.*Meloidogyne javanica* Pato Branco

variedade 'Carioca'

Meloidogyne incognita Umuarama

variedade 'Campineira' (feijão-vagem)

Meloidogyne incognita MorretesGrevilea - *Grevillea robusta* A. Cunn.*Meloidogyne* sp. Tuneiras do Oeste, em mudas*Meloidogyne incognita* Cianorte, Maria Helena e Xambrê, em mudas*Meloidogyne javanica* Tuneiras do Oeste, em mudasHortênsia - *Hydrangea hortensis* Siebold*Meloidogyne incognita* CuritibaIpê amarelo - *Tabebuia* sp.*Meloidogyne* sp. Irati, em mudas*Meloidogyne incognita* Irati, em mudas

Ligastro - *Ligustrum* sp.

Meloidogyne javanica Iratí, em mudas

Pepineiro - *Cucumis sativus* L.

variedade 'Aó dai'

Meloidogyne sp. Paranaguá

Soja - *Glycine max* Merrill

variedade 'Davis'

Meloidogyne incognita Lapa

variedade 'Santa Clara'

Meloidogyne javanica Arapoti

variedade 'UFV-1'

Meloidogyne javanica Itapejara do Oeste

variedade 'Viçosa'

Meloidogyne javanica Mangueirinha

Timbó - *Ateleia glazioveana* Baill.

Meloidogyne javanica Colombo, em mudas

Tomateiro - *Lycopersicon esculentum* Mill

variedade 'Brasilião'

Meloidogyne sp. Colombo

variedade 'Paulista'

Meloidogyne incognita Peabirú

Esta lista representa o material examinado entre 1981 e meados de 1983 pelo Laboratório de Fitoparasitologia, sendo que os levantamentos das plantas hospedeiras, bem como o mapeamento das regiões que apresentam os nematóides causadores de galhas estão tendo continuidade. Tais informações são importantes para se buscar um eficiente controle destes nematóides e evitar-se a contaminação de áreas isentas dos mesmos, principalmente, em um estado eminentemente agrícola como o Paraná.

SUMMARY

Occurrence of root-knot nematodes of the genus *Meloidogyne* Goeldi, 1887 (Nematoda, Heteroderidae) on some cultivated plants in Paraná State, Brazil.

Meloidogyne incognita, *M. javanica* and *M. hapla* are found attacking different varieties of cultivated plants in several regions of the Paraná State. The occurrence of those nematodes on some of the hosts are for the first time recorded for this State.

LITERATURA CITADA

- ANTONIO, H. & P.S. LEHMAN, 1978. Nota sobre a ocorrência de nematóides do gênero *Meloidogyne* em algumas ervas daninhas nos Estados do Paraná e do Rio Grande do Sul. **Publ. Soc. Bras. Nematol.** 3: 29-32.
- FONTOURA, O.S., E. STAMMER & F. CZAJA NETO, 1980. Contribuição ao levantamento fitossanitário do Estado do Paraná. **Arq. Biol. Tecnol.** 23(1): 11-23.
- IEDE, E.T., J.A. STURION & D.C. AHRENS, 1983. Ocorrência de nematóides das galhas nas raízes, *Meloidogyne incognita* (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 e *M. javanica* (Treub, 1885) Chitwood, 1949 em bracatinga *Mimosa scabrella* Bent. no Estado do Paraná. **EMBRAPA, URPFCS, Pesq. Andamento**, 76(1): 221-222.
- LORDELLO, L.G.E. & A.P.L. ZAMITH, 1960. Incidência de nematóides em algumas culturas de importância econômica. **Div. Agron. Shell** 2: 27-33.
- LORDELLO, L.G.E., 1964. Contribuição ao conhecimento dos nematóides que causam galhas em raízes de plantas em São Paulo e Estados vizinhos. **An. Esc. Sup. Agric. "Luiz de Queiroz"** 21: 181-218.

LORDELLO, L.G.E., F. CARNEIRO FILHO, E.K. REBEL, J.A. GUIDOLIN & R.R.A. LORDELLO, 1974. Identificação de nematóides em cafezais do Estado do Paraná. *Publ. Soc. Bras. Nematol.* 1: 16-24.

LORDELLO, L.G.E., 1981. **Nematóides das plantas cultiva-das**, 6a. ed., Livr. Nobel S.A., São Paulo, 314 pp.

PONTE, J.J., 1977. **Nematóides das galhas: espécies ocorrentes no Brasil e seus hospedeiros. Coleção Mossoroense**, vol. LIV, 97 pp.

VERNALHA, M.M., O. ZAPPIA, R. MANSUR & S. RODRIGUES, 1967/70. Sobre a ocorrência de nematóides do cafeeiro no Estado do Paraná. *Arq. Biol. Tecnol.* 13: 33-37.