

REVISTA DE AGRICULTURA

Cx. Postal 60
13.400 Piracicaba
Est. de S.Paulo-Brasil

Diretores
Prof. Dr. S. de Toledo Piza Jr.
Prof. Dr. F. Pimentel Gomes
Prof. Dr. Ph. W.C. Vasconcellos
Secretário
Prof. Dr. Luiz Gonzaga E. Lordello

VOL. 60

JUNHO/1985

Nº 1

A SEGUNDA ESPECIE DO GÊN. *Oestrophora*
(PHASMATODEA-PHYLLIDAE)

S. de Toledo Piza Jr.¹

Oestrophora vittata sp.n.

♂ - Caput vittis obscuris et pallidis alternatim dis-
positis, plus minusve distinctis, ornatum. Antennae for-
tes, articulis basalibus cum oculis colore capitinis, ar-
ticulis reliquis pallidis sed intus obscuris. Pronotum
capiti simile. Mesonotum pronoto simile vel luteo-marmo-
ratum. Gula et sterna vitta lata castanea in medio orna-
ta, metasternum necnon castaneo marmoratum. Femora co-
lore corporis. Elytra apice rotundata, cum pars ante-
rior alarum pallide reticulata, tuberculo conico, parvo,
spina nigra armato, praedita. Abdomen subtus partim cas-
taneum. Segmentum anale carinatum, subtruncatum. Cerci
cylindrici, intus nigricantes, extremitatem abdominis val-
de superantes. Lamina subgenitalis brevis, obtusa, mar-
gine vix emarginato.

Longitudo corporis	47 mm
Longitudo pronoti	3
Longitudo mesonoti	5
Longitudo elytrorum	6
Longitudo fem. ant.	13
Longitudo fem. post.	14

Pátria: Boracéia, Salesópolis, SP.

Col.: Rabello, 20.11.63

Tipo: 1 ♂ no Dep. Zool. ESALQ, Piracicaba, SP.

Paratipo: 1 ♂, Muru, Nova Friburgo, R.J., Cred & Guimaraes, col. 12/76.

Que me conste é essa a segunda espécie do gênero. Difere de *Oestrophora triangulifera* Redtb. pelas antenas destituídas de anéis claros, pelo colorido do corpo e pelo segmento anal não exciso.